





GASTRO-HEPATOLOGY & PANCREAS

PARASITOLOGY DEPARTMENT
FACULTY OF MEDICINE, TRISAKTI UNIVERSITY
2021

Prevalensi Balita Diare Menurut Provinsi, SSGI 2022



NEMATODA USUS

ASCARIS LUMBRICOIDES

TRICHURIS TRICHIURA


HOOKWORM

DISTRIBUSI GEOGRAFIS

- HASIL SURVEI DI BEBERAPA TEMPAT DI INDONESIA: PREVALENSI INFEKSI *ASCARIS LUMBRICOIDES*, *HOOKWORM*, *TRICHURIS TRICHIURA* MASIH TINGGI
- BIASANYA DITEMUKAN DI **DAERAH PANAS, LEMBAB** DAN **SANITASI YANG KURANG**
 - CONTOH : DAERAH PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN
 - DI INDONESIA PREVALENSI TINGGI, TERUTAMA DI DAERAH PEDESAAN

KEBIASAAN YANG BERHUBUNGAN ERAT DENGAN TINGGINYA ANGKA INFEKSI DAN REINFEKSI STH, KHUSUSNYA PADA BALITA DAN ANAK USIA SEKOLAH :


- BAB SEMBARANGAN DI SEKITAR RUMAH
- TIDAK MENCUCI TANGAN SEBELUM MAKAN, BERMAIN TANPA ALAS KAKI
- GEOPHAGIA

The background of the slide is a light gray gradient. It is decorated with several realistic water droplets of various sizes, primarily located in the top-left, top-right, and bottom-right corners. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

MORFOLOGI

ASCARIS LUMBRICOIDES

ADULT WORMS




Jantan : 15-30 cm

Betina : 20-35 cm

Masa hidup : 1-2 tahun

Habitat : usus halus

EGGS



Telur yang tidak dibuahi : oval, ukuran: 90 μm

Telur yang dibuahi : oval, lapisan albuminoid, warna coklat kekuningan,
uk: 75 μm x 50 μm


Telur berkembang dengan baik di tanah dengan kelembaban tinggi, 25-30 ° C

Telur menjadi bentuk infeksi dalam 2-3 minggu


LIFE CYCLE

Betina : 20 to 35 cm


Jantan : 15 to 30 cm



PATOLOGI & MANIFESTASI KLINIS



Efek mekanik :
nausea, nafsu makan
berkurang, diare atau
konstipasi,
malabsorpsi



Efek migrasi larva :
demam, dyspnea,
batuk, malaise,
pneumonia



MORFOLOGI

HOOKWORM

NECATOR AMERICANUS

ANCYLOSTOMA DUODENALE



NECATOR AMERICANUS

- CACING DEWASA HIDUP DI JEJUNUM DAN ILEUM BAGIAN ATAS, MENEMPEL PADA BAGIAN MUKOSA DAN BISA BERTAHAN HIDUP SELAMA 1 TAHUN
- *N. AMERICANUS* BETINA → TELUR 5000-10.000 TELUR /HARI ,
A. DUODENALE 25.000 TELUR /HARI
- *ANCYLOSTOMA DUODENALE* HAMPIR TIDAK PERNAH DITEMUKAN DI INDONESIA

ADULT WORMS

Hookworm

Female



Male



N. americanus : tubuh berbentuk seperti huruf **S**
A. duodenale : tubuh berbentuk seperti huruf **C**
betina 1 cm; jantan 0,8 cm

ORAL CAVITY

N. AMERICANUS

→ SEPASANG

BENDA KITIN



ORAL CAVITY

2 PASANG GIGI




EGGS



bentuk: Oval; Uk: 60 x 40 μm
Dinding tipis, 1 lapis, berisi morula
Berkembang lebih baik pada tanah gambut (pasir,
humus) dengan suhu optimum 28-32°C


Filariform (L3) Stage



Hookworm

100 μ m


Rhabditiform




Hookworm

100 μ m

LIFE CYCLES



3 FASE PATOLOGI



Manifestasi klinis

PATOLOGI DAN MANIFESTASI KLINIS

STADIUM LARVA :

1. CUTANEUS

- *CUTANEOUS LARVA MIGRANS* : BENTUK EFEK DARI PENETRASI LARVA KE KULIT
- *GROUND ITCH* → EFEK DERMATITIS YANG DISEBABKAN OLEH PENETRASI LARVA FILARIFORM DALAM JUMLAH BANYAK
- NYERI DAN IRITASI MENGIKUTI PENETRASI
- INFEKSI LARVA FILARIFORM *A. DUODENALE* SECARA ORAL MENYEBABKAN **WAKANA DISEASE** DENGAN GEJALA NAUSEA, MUNTAH, IRITASI FARING, BATUK, SAKIT TENGGOROKAN DAN SERAK

2. PULMONAL

- GEJALA PARU DISEBABKAN OLEH MIGRASI LARVA DI KAPILER KE DALAM ALVEOLI → BATUK KERING, DEMAM, ASMA + MENGI

PATOLOGI DAN MANIFESTASI KLINIS

STADIUM CACING DEWASA :

***GEJALA TERGANTUNG SPESIES DAN JUMLAH CACING YANG
MENGINFEKSI DAN JUGA KONDISI NUTRISI PASIEN***

- IRITASI USUS HALUS
- NAUSEA, MUNTAH , NYERI ABDOMINAL, DIARE
- TINJA DENGAN DARAH DAN LENDIR

PATOLOGI DAN MANIFESTASI

MANIFESTASI SISTEMIK KLINIS

1. ANEMIA KRONIS AKIBAT KEKURANGAN ZAT BESI.
 - *NECATOR AMERICANUS* → JUMLAH DARAH YANG HILANG PER HARI 0.03 ML PER CACING
 - JUMLAH TOTAL DARAH YANG HILANG SETIAP HARI 2 ML / 1000 TELUR/ GRAM TINJA
 - *ANCYLOSTOMA DUODENALE* → JUMLAH DARAH YANG HILANG PER HARI 0.15 - 5 ML / 1000 TELUR/ GRAM TINJA
2. HB DAPAT TURUN SAMPAI 5 G / DL ATAU LEBIH RENDAH
3. PADA ANAK-ANAK, INFEKSI HOOKWORM DAPAT MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN MENTAL DAN FISIK



TRICHURIS TRICHIURA

- PENYAKIT : *TRICHURIASIS*
- PENYEBAB INFEKSI TERTINGGI KEDUA PADA MANUSIA
- INTENSITAS INFEKSI TERTINGGI PADA ANAK USIA 5-15 TAHUN

MORFOLOGI

BETINA : $\pm$ 5 CM

JANTAN : $\pm$ 4 CM


UKURAN **TELUR**

50-54 MM X 32
MM

CACING DEWASA
HIDUP DI **KOLON**
ASCENDEN DAN
CAECUM



LIFE CYCLES



MANIFESTASI KLINIS

- GEJALA RINGAN SAMPAI ASYMPTOMATIS
- JUMLAH CACING BANYAK: DIARE DENGAN TINJA BERLENDIR, NYERI ABDOMINAL, DEHIDRASI, ANEMIA, LEMAH, DAN BERAT BADAN TURUN
- INFEKSI PARAH BIASANYA PADA ANAK-ANAK → CACING TERSEBAR SEPANJANG KOLON DAN REKTUM
- PROLAPSUS REKTAL BISA TERJADI PADA ORANG YANG BANYAK MENGEDAN SELAMA DEFEKASI
- ANEMIA

INTESTINAL NEMATODES
SOIL TRANSMITTED HELMINTH

DIAGNOSIS, TERAPI & KONTROL

Specific clinical features/syndromes

General features

Larval migration

Adult gastrointestinal parasitism

Ascariasis

Verminous pneumonia

Lactose intolerance

Impaired growth

Vitamin A malabsorption

Impaired physical fitness

Intestinal obstruction

Impaired cognition

Hepatopancreatic ascariasis

Reductions in school attendance and performance

Trichuriasis

None

Colitis

Trichuris dysentery syndrome

Rectal prolapse

Hookworm

Ground itch

Intestinal blood loss

Cough

Iron-deficiency anaemia

Wakana disease

Protein malnutrition

DIAGNOSIS

- PEMERIKSAAN LANGSUNG TINJA : MENEMUKAN **TELUR**
- PADA MIGRASI LARVA → MENEMUKAN **LARVA** DI **SPUTUM**
ATAU **BILASAN LAMBUNG**

TERAPI

PENGOBATAN BISA DILAKUKAN SECARA *INDIVIDUAL ATAU MASAL*

1. TERAPI INDIVIDUAL

- PIPERAZINE,
- PYRANTEL PAMOATE 10 MG/KG BB,
- MEBENDAZOLE 500 MG ATAU ALBENDAZOL 400 MG

- TRICHURIASIS:

- ALBENDAZOLE 400 MG DOSIS TUNGGAL
- MEBENDAZOLE 100 MG, 2X/HARI, SELAMA 3 HARI

- OXANTHEL-PYRANTEL PAMOATE DAPAT DIGUNAKAN UNTUK INFEKSI CAMPUR ASKARIASIS DAN TRICHURIASIS

TERAPI

OBAT-OBAT DI ATAS **EFEKTIF** UNTUK MEMBUNUH **CACING DEWASA** TAPI **BELUM TERBUKTI** KEEFEKTIFANNYA DALAM MEMBUNUH **STADIUM LARVA**

2. PENGOBATAN MASAL → MEMBUTUHKAN BEBERAPA KONDISI :
 - OBAT BISA DITERIMA OLEH KOMUNITAS, MEMILIKI ATURAN MINUM YANG MUDAH, MEMILIKI SEDIKIT EFEK SAMPING, EFEKTIF UNTUK BEBERAPA SPESIES CACING, MURAH
 - DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH : ALBENDAZOLE 400 MG, 2X/TAHUN PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR

KONTROL & PENCEGAHAN

FAKTOR UTAMA ADALAH **PENYEBARAN TANAH**
YANG **TERKONTAMINASI DENGAN TINJA**,
UMUMNYA KARENA PENGGUNAAN TINJA SEBAGAI
PUPUK

- PENGOBATAN MASAL DI DAERAH ENDEMIS
- MEMBUAT TOILET YANG BAIK, BERSIH DAN SEHAT
- SANITASI LINGKUNGAN DAN EDUKASI KEBERSIHAN PRIBADI (TERUTAMA ANAK-ANAK)
- CUCI TANGAN SEBELUM MAKAN
- CUCI SAYURAN YANG DIMAKAN MENTAH



TAENIASIS

TAENIA SOLIUM

TAENIA SAGINATA


TAENIA ASIATICA



Life cycles of three human *Taenia* tapeworms

Taenosis worm stage

Results from ingestion of
larvae in undercooked meat



Life cycles of *Taenia*


three human tapeworms



adult worms



Taenia saginata Goeze, 1782
Beef tapeworm



beef



Taenia solium Linnaeus, 1758
Pork tapeworm



pork

Human
cysticercosis



Taenia asiatica Eom and Rim, 1993
Asian tapeworm



viscera

Cysticercus hominis

C. cellulosae

C. viscerotropica

musculotropism

viscerotropism

egg



Morphological features	<i>T. saginata</i>	<i>T. asiatica</i>	<i>T. solium</i>
<u>Scolex</u>			
Rostellum	Absent	Present	Present
Hooklets	Absent	Absent	Present
Apical pit	Absent	Present	Absent
<u>Mature proglottid</u>			
Ovary	2 lobes	2 lobes	3 lobes
Testis (number)	800-1200	324-1216	375-575
Vaginal sphincter	Present	Present	Absent
<u>Gravid proglottid</u>			
Uterine branches (each side number)	14-32	11-31	7-16
Pattern of uterine branching	Dichotomous	Dichotomous	Dendritic
Expulsion from host	Actively, usually in singles	Actively, usually in singles	Passively during defaecation usually in groups
Posterior protuberance	Absent, if present-not prominent	Present and prominent	Absent
<u>Cysticercus</u>			
Size	6-10 mm×4-6 mm	2 mm×2 mm	5-8 mm×3-6 mm
Scolex	No rostellum or hooklets. Apical pit seen	Sunken rostellum with rudimentary hooklets	Rostellum with hooklets
Bladder wall outgrowths	Rugose	Warty with microtriches	Absent
Intermediate hosts (cysticercus/metacestodes seen)	Cattle	Pigs, occasionally cattle and goat	Pigs, humans


T. saginata: *Taenia saginata*, *T. asiatica*: *Taenia asiatica*, *T. solium*: *Taenia solium*. Adapted from references [1, 10, 12].

Taenia solium


Taenia saginata

Taenia asiatica

Strobila 1-12 m



Scolex
0.6-2.0 mm



Mature proglottid
2.1-4.5 mm



Gravid proglottid
0.3-2.2 cm



Egg
16-45 µm



Human brain



Cow heart



Pig liver

Cysticercus
0.4-3.5 cm

Carl Hagedorn

TELUR *TAENIA* *SP.*

- UKURAN TELUR 35-30 MIKRON
- BERISI EMBRIO HEKSAKAN/ONKOSFER
- BULAT
- DINDING TEBAL, STRUKTUR LINIAR
- MEMILIKI 6 BUAH KAIT-KAIT



GEJALA KLINIS

- SAKIT ULU HATI, DYSPEPSIA
- ANOREXIA, VOMITUS
- DIARE
- PUSING
- DITEMUKAN PROGLOTID BERGERAK LEWAT DUBUR BERSAMA / TANPA TINJA
- ILEUS → BILA MASUK APENDIX
- BERAT BADAN ↓↑
- EOSINOFILIA → PADA DARAH TEPI
- GEJALA KLINIS LEBIH BERARTI DISEBABKAN OLEH LARVA → SISTISERKOSIS


DIAGNOSIS & THERAPY


- DITEMUKAN PROGLOTID YANG BERGERAK AKTIF DALAM TINJA ATAU KELUAR SPONTAN
- TELUR DALAM TINJA ATAU ANAL SWAB
- PRAZIKUANTEL 5-10 MG/KG BB, SINGLE DOSE
- ALBENDAZOL
- KUINAKRIN
- AMODIAKUIN
- NIKLOSAMID

GEJALA SISTISERKOSIS

- JARINGAN : SUBKUTIS,MATA,OTAK,OTOT,JANTUNG,HATI, PARU DAN RONGGA PERUT
- KALSIFIKASI SISTISERKUS → GEJALA JARANG
- OTOT → PSEUDOHIPERTROFI OTOT + MIOSITIS, DEMAM TINGGI, EOSINOFILIA
- PADA OTAK + MEDULA SPINALIS → EPILEPSI, MENINGO-ENSEFALITIS, NYERI KEPALA, KELAINAN JIWA
- HIDROSEFALUS → SUMBATAN ALIRAN CAIRAN LCS
- KEMATIAN → SISTISERKUS TUNGGAL DALAM VENTRIKEL IV OTAK

SISTISERKUS SELULOSA





Entamoeba

histolytica



Fedor
Alexandre
witch Lösch
(1875)

Hospes dan Distribusi Geografik

Hospes :
manusia!!!

Amoebiasis

Kosmopolit

Stadium

```
graph TD; Stadium[Stadium] --- Trofozoit[Trofozoit]; Stadium --- Kista[Kista];
```


Trofozoit

Kista


histolytica


Minuta

Trofozoit





Daur hidup





ENTAMOEBA HISTOLYTICA

- BENTUK KISTA
 - UKURAN : 10 - 20 MIKRON
 - BENTUK BULAT ATAU OVAL
 - DINDING TIPIS (0,5 MIKRON),
TIDAK AMBIL WARNA
 - SITOPLASMA :
 - VAKUOL GLIKOGEN
 - BENDA KROMATOID
 - INTI ENTAMOEBA : JUMLAH 1-(2)-4



ENTAMOEBA HISTOLYTICA

- BENTUK MINUTA
 - UKURAN : 10 - 20 MIKRON
 - EKTOPLASMA :
 - PSEUDOPODIUM DIBENTUK PERLAHAN-LAHAN
 - PERGERAKAN TIDAK PROGRESIF
 - ENDOPLASMA
 - BERVAKUOL
 - BAKTERI DAN SISA MAKANAN
 - INTI ENTAMOEBA



ENTAMOEBA HISTOLYTICA

- BENTUK HISTOLITIKA
 - UKURAN : 15 - 30 MIKRON
 - EKTOPLASMA :
 - LEBAR, BENING
 - 1/3 BAGIAN PARASIT
 - PSEUDOPODIUM SEPERTI JARI
DIBENTUK CEPAT
 - ENDOPLASMA
 - BERGRANULA HALUS
 - MENGANDUNG ERITROSIT
 - INTI ENTAMOEBA



Amoebiasis intestinal

Akut


Kronik

Amoebiasis ekstra intestinal

Amoebiasis hati


Amoebiasis
rektum, paru,
perianal,
vagina

DIAGNOSIS



TERAPI



The image features ten cartoonish, teardrop-shaped parasites with large, expressive eyes and multiple wavy flagella. They are scattered across a light beige, textured background. The parasites are colored in various ways: some are solid red, some are solid blue, some are solid yellow, and others are split vertically (half red, half blue, half yellow, or half green).

Giardia intestinalis

GIARDIASIS



ANTHONIE VAN LEEUWENHOEK (1632-
1723)

GIARDIASIS



WORLDWIDE



CHILDREN



ASIMPTOMATIK, ACUTE & CHRONIC



**HIGH MORBIDITY, CHRONIC
DIARRHEA & GROWTH RETARDATION**



FOOD-BORNE DISEASES

ETIOLOGI


- *GIARDIA INTESTINALIS* → PROTOZOA FLAGOTIDA (SEBELUMNYA DIKENAL DENGAN *GIARDIA LAMBLIA*).
- INFEKSI DITULARKAN MELALUI KONSUMSI KISTA
- MEMILIKI BEBERAPA STRAIN
 - KEMAMPUAN MENYEBABKAN PENYAKIT, DAN
 - BEBERAPA STRAIN YANG BERBEDA DAPAT DITEMUKAN DI SATU HOST SELAMA INFEKSI.
- INFECTION RATE 100% JIKA MENELAN LEBIH DARI 25 KISTA.

EPIDEMIOLOGI


- INFEKSI ENDEMIK PALING SERING TERJADI PADA ANAK-ANAK <5 TAHUN DAN ORANG DEWASA BERUSIA 25-39 TAHUN
- TINGKAT CARRIER SETINGGI 30-60% DILAPORKAN TERJADI PADA ANAK-ANAK, TERUTAMA DI PUSAT PENITIPAN ANAK
- CARRIER ASIMTOMATIK PADA ANAK SEBANYAK 20% DAN PADA ANAK < 36 BULAN DI TEMPAT PENITIPAN ANAK → BERTAHAN SELAMA BEBERAPA BULAN
- BANYAK ANAK DENGAN GIARDIASIS SIMTOMATIK, MAMPU MENULARKAN PENYAKIT INI KE DALAM RUMAH MEREKA → TINGGINYA TINGKAT ENDEMIK DI KOMUNITAS MEREKA

PERBEDAAN RAS, JENIS KELAMIN, DAN USIA BERKAITAN DENGAN INSIDENS

- GIARDIASIS TIDAK MEMILIKI PREDILEKSI RAS KHUSUS
- LAKI-LAKI > WANITA → RR 1.19
- < 6 BULAN – BAYI & KANAK-KANAK– REMAJA



PENULARAN








EX:


DAY CARE

KONSUMSI AIR SUNGAI/DANAU


TANPA FILTER

MIKROS





Siklus Hidup *Giardia intestinalis*



PATOFISIOLOGI

Giardia melekat di sel epitel usus halus

Perubahan histopatologi mukosa

Atrofi vilus, enterosit rusak, hiperplasia kriptus

Tekanan hisapan dari perlekatan trofozoit

Mikrovili rusak

Multiplikasi trofozoit

Terbentuk sawar

GEJALA KLINIS

- BERVARIASI DARI ASIMPTOMATIK (TANPA KELUHAN) KE DIARE BERAT DAN MALABSORPSI (GANGGUAN PENYERAPAN).
- GIARDIASIS AKUT BERKEMBANG SETELAH MASA INKUBASI 1 SAMPAI 14 HARI (RATA-RATA 7 HARI) DAN BIASANYA BERLANGSUNG 1 SAMPAI 3 MINGGU.
- DIARE, SAKIT PERUT, KEMBUNG, MUAL, DAN MUNTAH.
- GIARDIASIS KRONIS GEJALA YANG BERULANG DAN MALABSORPSI DAN KELEMAHAN.

DIAGNOSIS

- SEDIAAN SAMPEL TINJA LANGSUNG DAN ATAU PROSEDUR KONSENTRASI → IDENTIFIKASI TROFOZOIT ATAU KISTA *GIARDIA INTESTINALIS*.
- SAMPEL CAIRAN DUODENUM (MISALNYA, ENTEROTEST) ATAU BIOPSI DUODENUM → TROFOZOIT.
- METODE ALTERNATIF :
 - TES IMUNOSORBEN ANTIGEN ENZYME-LINKED
 - TES IMMUNOASSAY
 - TES IMMUNOFLUORESCENCE

PENATALAKSANAAN

1. METRONIDAZOL → PALING SERING DIRESEPKAN
2. TINIDAZOL → *DRUG OF CHOICE* DI LUAR AMERIKA SERIKAT.
3. NITAZOXANIDE → ANAK.

PROGNOSIS

- PROGNOSIS GIARDIASIS UMUMNYA SANGAT BAIK.
 - KEBANYAKAN ASIMTOMATIK, DAN SEBAGIAN BESAR CARRIER.
 - BEBERAPA AGEN ANTIBIOTIK TERSEDIA DENGAN TINGKAT EFIKASI YANG BAIK → RESISTANSI OBAT
- TANPA DIOBATI, GIARDIASIS BISA BERLANGSUNG SELAMA BERMINGGU-MINGGU.
- **KOMPLIKASI:**
 - PENURUNAN BERAT BADAN, DEFISIENSI DISAKARIDA, MALABSORPSI, DAN RETARDASI PERTUMBUHAN.
 - BEBERAPA PASIEN DAPAT MENGALAMI GEJALA PERSISTEN

PENCEGAHAN

A. *AGAR TERHINDAR DARI GIARDIASIS*

- SELALU MENCUCI TANGAN MENGGUNAKAN SABUN DAN AIR MENGALIR SETELAH KE WC, MENANGANI BINATANG, MENGGANTI POPOK, TERSENTUH KOTORAN, BERKEBUN, ATAU SEBELUM MENYIAPKAN MAKANAN/MINUMAN.
- JANGAN MINUM AIR MENTAH DARI KALI, SUNGAI, TELAGA, BENDUNGAN, DAN TANGKI AIR.
 - MEREBUS AIR MINIMAL SELAMA 1 MENIT DAPAT MEMBUNUH GIARDIA.
 - TABLET PEMURNI AIR
 - FILTER AIR
- BILA PERGI KE NEGARA YANG PASOKAN AIR KURANG BAIK, JANGAN MINUM AIR MENTAH DARI KRAN.

PENCEGAHAN

B. AGAR TIDAK MENYEBAR

- ANAK KECIL YANG SEDANG DIARE SEBAIKNYA JANGAN KE SEKOLAH, PENITIPAN ANAK, ATAU KOLAM RENANG HINGGA DIARE MUTLAK SEMBUH.
- CARRIER HARUS MENJAGA KEBERSIHAN PRIBADI DAN LINGKUNGAN.

C. JIKA KITA TERKENA GIARDIASIS

- JANGAN MENYIAPKAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI ORANG LAIN
- JANGAN MENGGUNAKAN KOLAM RENANG
- JANGAN PINJAM-MEMINJAM HANDUK, SEPRAI, SENDOK-GARPU

EDUKASI

- PASIEN DAN INDIVIDU BERISIKO HARUS DIINSTRUKSIKAN MENGENAI METODE KEBERSIHAN YANG SESUAI DAN TANDA / GEJALA INFEKSI.
 - MENCUCI TANGAN DENGAN HATI-HATI SETELAH MENGGANTI POPOK.
 - PETUGAS PENITIPAN ANAK HARUS MENJAGA KEBERSIHAN YANG TELITI DAN MENCUCI TANGAN DENGAN HATI-HATI UNTUK MENGURANGI PENYEBARAN ANTARA ANAK-ANAK DAN STAF.
- PENDIDIKAN KEBERSIHAN PRIBADI UNTUK MEMINIMALKAN TRANSMISI ORANG-KE-ORANG.
- PASIEN HARUS DIBERI TAHU BAHWA KONTAK ORAL-ANAL DAN ORAL-GENITAL MENINGKATKAN RISIKO TRANSMISI JANIN.
- PENYULUHAN BAGI WISATAWAN YANG AKAN KE DAERAH-DAERAH ENDEMIK. SEBELUM MEMINUM AIR PERMUKAAN, MEREKA HARUS MEMBERSIHKANNYA DENGAN CARA MEREBUS ATAU PENGGUNAAN SENYAWA HALOGEN (MISALNYA KLOORIN) ATAU PERANGKAT PENYARINGAN.

TERIMA KASIH

